

NAGY PÓLING

Numenius arquata

KEVÉS HANG TUD olyan varázslatosan szólni a hajnali legelőn, mint a nagy póling hosszú, lelkesítő éneke. Népi neve szélkiáltó. Hazánkban vonulás közben, a tavaszi és az őszi hónapokban lehet vele találkozni, de néhány pár fészket is rak nálunk. Költőhelyül az északi országok hajnali ködbe burkolózó tőzeglápjait választja. Parti madaraink közül a legnagyobb.



ÉLŐHELYE: mocsaras, vizenyős vidékek, vízpartok

TÁPLÁLÉKA: rovarok, férgek, csigák

FÉSZKELŐHELYE: fűvel bélelt fészkek a talajon

TOJÁSAI: 4 pöttyös, zöldes tojás

MEGJELENÉSE: a tojó csőre hosszabb

TESTHOSSZA: akár 58 cm





TUDTAD?

Jellegzetes költőhelyeinek eltűnése miatt
e gázlómadarak száma egyre csökken.

CSÖRGŐ RÉCE

Anas crecca

APRÓ TERMETÉHEZ KÉPEST a hím csörgő réce meglepően éles hanggal fütttyent, de nemcsak erről, hanem más récével össze nem téveszthető zöld szemsávjáról is felismerhető. A tojó a récéktől jobban ismert, hápogó hangot hallat. Hazánkban ritka fészkelő, az őszi vonulási időszakban azonban sokszor jelentős létszámban láthatjuk tavainkon. Röptük rendkívül gyors.



ÉLŐHELYE: parti növényzettel benőtt tavak

TÁPLÁLÉKA: magvak, növényi részek, lárvák

FÉSZKELŐHELYE: fűvel bélelt fészkek a talajon

TOJÁSAI: 8–12 krémszínű tojás

MEGJELENÉSE: a tojó barna, kevésbé díszes

TESTHOSSZA: akár 38 cm





TUDTAD?

A hímek tavasszal bólogató mozdulatok sorával próbálják lenyűgözni a tojókat.

CSERREGŐ NÁDIPOSZÁTA

Acrocephalus scirpaceus

EGY AKROBATA ÜGYESSÉGÉVEL kapaszkodik a nádszálakba, a hímek így énekelnek ciripelő hangjukon. Vonuló madár, hazánkba áprilisban érkezik, afrikai telelőhelyére szeptemberben kel útra. A hím kitartóan, sok hasonló versszak ismétlésével próbálja lenyűgözni a tojókat. Ha le szeretnénk őket fülelni, a júliusig tartó költési szezon alatt érdemes hajnalban vagy alkonyatkor felkeresni vízparti élőhelyeiket.

ÉLŐHELYE: part menti nádasok, gyékényesek

TÁPLÁLÉKA: rovarok és pókok

FÉSZKELŐHELYE: kerek kosárka a nádszálakon

TOJÁSAI: 4–5 halványzöld tojás pöttyökkel

MEGJELENÉSE: a tojó és a hím hasonló

TESTHOSSZA: 13 cm



TUDTAD?

A kakukk előszeretettel csempészi tojásait
a cserregő nádiposzáta fészkébe.

SARKI BÚVÁR

Gavia arctica

SEJTELMES KIÁLTÁSÁT főleg a költési szezonban hallatja. Hazánkban azonban csak ritka átvonuló, október és május között bukkanhat fel a Balatonon és a Dunán, a költéshez a sarkkörü területeket választja. A telet a tengerek vizein tölti, ahol víz alá bukva halakra vadászik, majd törsszerű csőrével leszúrja azokat. A vízben igazi úszóbajnok, a szárazföldön azonban esetlenül totyog.

ÉLŐHELYE: tengerek, de a szárazföldi tavakon költ

TÁPLÁLÉKA: halak és más vízi élőlények

FÉSZKELŐHELYE: fészket a talajra építi

TOJÁSAI: 2 barna tojás fekete pöttyökkel

MEGJELENÉSE: a tojó és a hím hasonló

TESTHOSSZA: akár 75 cm



TUDTAD?

Télen a sarki búvárok feje és háta sötétebb, és a képen is látható csíkozott nyakminta eltűnik.