

ŐSZAPÓ

Aegithalos caudatus

BIZONYÁRA ELŐBB LESZEL figyelmes ennek az ügyes (kötéltáncosnak is remek) kismadárnak a hangjára, mint hogy megpillantanád. Télen az őszapók akár 20 egyedből álló csapatokban is repkedhetnek az ágak és a bokrok között, élelemért kutatva. Csicseregve csevegnek egymással, vagy a jellegzetes „csriá-csriá-csriá” hangot hallatják. Télen egymáshoz bújva melegednek.



ÉLŐHELYE: erdők, bokros területek, kertek


TÁPLÁLÉKA: főleg rovarok és pókok

FÉSZKELŐHELYE: bokrok alacsonyabb ágain lévő fészek

TOJÁSAI: akár 12 pöttyös, fehér tojás

MEGJELENÉSE: a hím és a tojó hasonló

TESTHOSSZA: 15 cm, de több mint a fele farktoll





TU DTAD?

Ha egy pár költése többször is meghiúsul,
besegítenek más őszapópár fiókáinak felnevelésébe.

NAGY FAKOPÁNCSS

Dendrocopos major

EZT AZ IZGÁGA madarat jellegzetesen éles riasztásáról is felismerheted, de leginkább kopácsolásáról híres, amellyel – főként tavasszal – territóriumát jelzi. Ezt a hangot úgy éri el, hogy csőrét üreges fatörzsekhez, faágakhoz ütögeti. A fiatal fakopáncsok a faodúból sivítva követelik szüleiktől a táplálékot.

ÉLŐHELYE: elegyes erdők, parkok, kertek

TÁPLÁLÉKA: hernyók, rovarok, magok

FÉSZKELŐHELYE: fába vájt odú

TOJÁSAI: 4-7 fényes, fehér tojás

MEGJELENÉSE: a hím tarkója piros, a tojóé fekete

TESTHOSSZA: 23 cm



TUDDAD?

A képen egy fiatal madár látható. Piros koronája három hónapos kora körül befeketedik.

KAKUKK

Cuculus canorus

A KAKUKK AZON madarak közé tartozik, amelyek a hangjukról kapták nevüket. Tollazata feltűnő, csíkos pizsamához hasonlít. Ez a nyári vendég áprilisban érkezik, és hírhedt fészekparazita: tojásait nem maga költi ki, hanem más fajok fészkébe rakja. A kakukkfióka kilöki a többi tojást, fiókát a fészekből, így ő kapja meg az összes táplálékot. A hím „kakukkolása” június közepéig hallható.



ÉLŐHELYE: erdők, megművelt területek, nádasok

TÁPLÁLÉKA: hernyók, rovarok, hangyák

FÉSZKELŐHELYE: más fajok fészke

TOJÁSAI: 1-1 tojás akár 20 fészekben

MEGJELENÉSE: a hím és a tojó általában hasonló

TESTHOSSZA: 33 cm





TUdTAD?

A kakukk leggyakoribb gazdamadara a nádirigó és a vörösbegy, de közel 50 faj fészékében találtak már kakukktojást vagy -fiókát.