

LÁRMÁS RÉTISAS

Haliaeetus vocifer

AFRIKA HANGJÁNAK IS NEVEZIK ennek a különleges sasnak a kiáltását, amely megtöri a hajnal csendjét, és néha egész nap hallható. A párok gyakran együtt lármázva űzik el a betolakodókat, mint ezen a felvételen is. A madarak kora reggel vadásznak, a nap hátralévő részét pedig egy vízparti fán ücsörögve töltik.



ÉLŐHELYE: folyók, tavak, mocsarak, torkolatok

TÁPLÁLÉKA: halak és kisebb állatok

UTÓDAI: 1-3 fióka

ÉLETTARTAMA: akár 24 év

MEGJELENÉSE: a tojó nagyobb termetű

TESTHOSSZA: akár 74 cm





TU DTAD?

A rétisasok gyakran más madaraktól lopnak táplálékot, akár a hatalmas óriásgémről is.

ALFÖLDI ZEBRA

Equus quagga

A ZEBRÁK HANGJA hasonlít a lovakéhoz. Horkantanak, amikor izgatottak, és halkan szuszognak egymás üdvözlésekor. A legtöbb zebra családi körben él, nagy hordákat is alkothatnak. Kapcsolattartáshoz különlegesen magas, ugatásszerű hangot hallatnak (itt is ez hallható), oroszlán- vagy hiénaveszély esetén pedig két hangzóból álló riadóval jeleznek.

ÉLŐHELYE: füves puszták, erdei élőhelyek

TÁPLÁLÉKA: fű

UTÓDAI: évente 1 csikó

ÉLETTARTAMA: 25 év

MEGJELENÉSE: a hím kicsivel nagyobb termetű

MAGASSÁGA: 1,5 m



TU DTAD?

A zebra és a ló keresztezéséből lesz a zebló,
a zebra és a szamár keresztezéséből
pedig a zebmár.

NÍLUSI VÍZILÓ

Hippopotamus amphibius

A VÍZILOVAK A NAPOT 10-20 egyedből álló csoportokban töltik a folyók és tavak vizében alámerülve, hűsölve. Alkonyatkor kimásznak a partra, majd táplálkozni indulnak, gyakran hosszú, jól bejáratott ösvényeken keresve fűből álló eledelüket. A vízilovak összetett mormogással, röffentésekkel, bugyborékolással és fújtatással kommunikálnak egymással.

ÉLŐHELYE: folyók, tavak, mangrove mocsarak

TÁPLÁLÉKA: rövid fű

UTÓDAI: kétévente 1 borjú

ÉLETTARTAMA: 40-50 év

MEGJELENÉSE: a hím nagyobb termetű és fogú

TESTHOSSZA: akár 5,1 m



TU DTAD?

A víziló nagy alsó fogai verekedésre valók,
erős ajkai pedig fűtépésre.