

# FÜLEMÜLE

*Luscinia megarhynchos*

EZT A NYÁRI vendéget inkább hallani fogod, mint látni. Nappali énekét sötétedéskor is folytatja. És micsoda dal ez! A legszebb és legbonyolultabb melódiákat este énekl, és nem sokkal éjféel előtt hallgat el. Minden szólam gazdagon díszített, mely fuvolatrillákból, hullámozó és gurgulázó hangok váltakozásából áll, rövid szünetekkel tarkítva.

ÉLŐHELYE: fás, bokros, cserjés területek

TÁPLÁLÉKA: rovarok, pókok, férgek, hernyók

UTÓDAI: 4-6 fióka

MIKOR HALLHATÓ: a hím áprilistól júniusig énekel

MEGJELENÉSE: a hím és a tojó hasonlít egymásra

TESTHOSSZA: 16,5 cm



*TU DTAD?*

A hajnali ének a birtokolt terület jelzését,  
a rivális hímek távoltartását és a tojók  
odacsalogatását szolgálja.

# GÍMSZARVAS

*Cervus elaphus*

AZOK A GÍMSZARVASBIKÁK sikeresebbek az udvarlásban, amelyek hangosabban tudnak bőgni. Hallgasd meg a zengő szarvasbögést ősszel, a párzás időszakában! Ilyenkor a bikák háremszerzési célból vagy a háremük védelmében összecsapnak. Kora hajnalban és késő este lehangosabb a bögés, de néha egész éjjel hallható ez a különleges koncert.



ÉLŐHELYE: tisztásokkal, rétekkal tarkított erdők

TÁPLÁLÉKA: növények, levelek, termések, rügyek

UTÓDAI: 1, május–június táján született borjú

MIKOR HALLHATÓ: a gímszarvasbikák ősszel bögnek

MEGJELENÉSE: a bika nagyobb testű, agancsos

TESTHOSSZA: akár 2,5 m





*TUDDAD?*

A bika február és április között hullajtja el az agancsát, és júliusban kezd újat növeszteni.

# KUVIK

*Athene noctua*

A KUVIKNAK bájosan bosszús megjelenést kölcsönöz dús „szemöldöke”. Alig nagyobb egy feketerigónál, az egyik legkisebb európai bagoly, amelyet napközben épületeken vagy kéményeken ülve láthatunk. Késő tavasszal, a párzási időszakban mind a hím, mind a tojó hallatja nyávogásszerű hangját, de a hím gyászos huhogása már hamarabb is felcsendül.



ÉLŐHELYE: tanyák, ember alkotta vidéki környezet

TÁPLÁLÉKA: kisemlősök, rovarok, énekesmadarak

UTÓDAI: 3-5 fióka

MIKOR HALLHATÓ: leginkább márciusban és áprilisban

MEGJELENÉSE: a tojó kicsivel nagyobb, mint a hím

TESTHOSSZA: 23 cm





*TUDDAD?*

Ha a kuvik nagyon figyel valamire, fel-le és körkörösén mozgatja a fejét: ez segíti a távolságok bemérésében.

# VÖRÖS RÓKA

*Vulpes vulpes*

A VÖRÖS RÓKA az egyik leggyakrabban előforduló éjszakai szőrmés ragadozó, amely a városi élethez is alkalmazkodott. A rókák hátborzongató kiáltása a decembertől februárig tartó párzási időszakban hallható, amely csak egy a rókák által kiadott hangok közül. Repertoárjukban szerepel a nagyon magas, üdvözlésre használt nyüszítés, az agressziót jelző, torokból jövő szaggatott morgás és az éhes kölykök nyafogása is.



ÉLŐHELYE: szinte mindenhol előfordul

TÁPLÁLÉKA: kisebb állatok, gyümölcsök

UTÓDAI: 3-6 kölyök, amelyek tavasszal születnek

MIKOR HALLHATÓ: egész évben, de télen gyakrabban

MEGJELENÉSE: a nőstény kisebb termetű

TESTHOSSZA: a farokkal együtt akár 1 m





*TU DTAD?*

A rókák tavasszal nagytakarítást tartanak kotorékukban, s ennek során szabadulnak meg a felesleges földmennyiségtől.



# LAPPANTYÚ

*Caprimulgus europaeus*

A NAPLEMENTE és napkelte körüli órákban aktív állatok egyike e titokzatos madár, amelynek hímje ilyenkor kezdi ciripelő énekét. Ezt egy ágról (vagy a talajról) és repülés közben is hallatja, és akár órákig is eltart. Általában csak a hangja árulkodik arról, hogy egy lappantyú van valahol a közelben, mert a fakéreg mintázatához hasonló tollruhájával képes teljesen belevadni környezetébe.



ÉLŐHELYE: erdőszélek, borókások, tarvágások

TÁPLÁLÉKA: éjjel aktív rovarok, lepkék

UTÓDAI: 2 fióka

MIKOR HALLHATÓ: késő tavasszal, kora nyáron

MEGJELENÉSE: a hím testén fehér foltok vannak

TESTHOSSZA: 28 cm





*TU DTAD?*

Ez a nyári látogató késő tavasszal érkezik,  
és augusztusban vagy szeptemberben vonul el.